

KEGLEOPERATION AF LIV-MODERHALSEN (CONISATIO)

HVAD ER EN KEGLEOPERATION?

Det er en operation, hvor lægen fjerner et kegleformet stykke af livmoderhalsen, hvor der er fundet celleforandringer.

HVILKEN BEDØVELSE ANVENDES VED KEGLEOPERATIONEN?

Kegleoperationen foregår i lokal bedøvelse. Det er den samme bedøvelse vi anvender ved den forudgående vævsprøve.

HVOR LANG TID VARER OPERATIONEN?

Operationen varer kun 15-20 minutter inklusive anlæggelse af bedøvelse. Normalt kan du gå hjem efter 10 – 15 minutters observation i vores hvileområde.

HVORDAN SKAL JEG FORBEREDE MIG TIL KEGLE- OPERATIONEN?

Vi anbefaler, at du tager 2 tabletter Panodil (Pamol, Paracetamol, Pinex) á 500 mg og 2 tabletter Ibuprofen (Ibuprofen, Burana, Iprex) á 200 mg cirka 1 time før indgrebet, da du kan få lette menstruationslignende smerter. Du kan med fordel også se filmen om kegle-operation lavet af vores kolleger i Region Sjælland: <https://region-sjaelland.23video.com/keglesnit-1> Hos os oplever du dog ikke nogen smerter eller ”jag”, da vi bedøver grundigt og altid venter 5 minutter fra bedøvelsen er lagt til operationen startes.

ER DER SMERTER EFTER KEGLE-OPERATIONEN?

Normalt vil du ikke have smerter efter operationen.

Ved smerter anbefaler vi, at du tager 2 tabletter Paracetamol (Pinex, Panodil, Pamol) á 500 mg max. 4 gange i døgnet og evt. supplerer med 2 tabletter Ibuprofen á 200 mg max. 3 gange i døgnet. Du kan købe begge præparater i håndkøb på apoteket.

HVORDAN SKAL JEG FORHOLDE MIG EFTER KEGLE-OPERATIONEN?

I løbet af 1 - 2 dage kan du genoptage dine normale aktiviteter, som arbejde, sport og lignende. Du skal dog vente med hård sport i 3-4 uger.

HVILKE KOMPLIKATIONER KAN KEGLEOPERATIONEN MEDFØRE?

Komplikationer er meget sjældne. I de første 14 dage, skal du kontakte os, hvis du får:

- ❖ Kraftige underlivssmerter.
- ❖ Kraftig blødning, som er kraftigere end menstruation, eller tiltagende.
- ❖ Temperatur over 38 grader.

Uden for klinikkens åbningstid, skal du kontakte egen læge eller 1813

KAN DER KOMME BLØDNING?

Ja, særligt i de første par uger efter operationen, er det normalt at have:

- ❖ Små-blødninger.
- ❖ Brunligt, vandigt udflåd.
- ❖ Lettere ildelugtende udflåd.
- ❖ 10 - 14 dage kan du få lidt frisk blødning i forbindelse med at sårskorpen løsner sig og afstødes.
- ❖ Efter 3 - 6 uger er slimhinden helet op, og en ny slimhinde dækker området.

→ Fortsættes

HVAD SKAL JEG GØRE FOR AT UNDGÅ INFEKTIONER?

Så længe du har anderledes udflåd, (ca. 2 uger) bør du:

- ❖ Undgå samleje de første 14 dage, herefter skal du benytte kondom.
- ❖ Undgå karbad, svømmehal og havbad.
- ❖ Bruge hygiejnebind fremfor tamponer.

HAR KEGLEOPERATIONEN BETYDNING FOR FREMTIDIG GRAVIDITET?


Muligheden for at blive gravid og det seksuelle samliv påvirkes ikke af kegleoperationen. kegleoperationen kan give en let øget risiko for at føde for tidligt, hvis man må foretage det flere gange.

HVORDAN FÅR JEG SVAR PÅ RESULTAT AF VÆVSPRØVEN?

Inden du går hjem, aftaler du med lægen, hvordan du får svar. Det sker normalt via lægevejen inden for 10-14 dage.

HVEM KAN JEG RINGE TIL VED SPØRGSMÅL?

Du er velkommen til at ringe til Kvindeklinikken alle hverdage i telefontiden, på 36 46 71 40.



Området i livmoderhalsen der fjernes ved en kegleoperation