

PASSAGEUNDERSØGELSE AF ÆGGELEDERNE /HSU

PASSAGEUNDERSØGELSE AF ÆGGELEDERNE; HSU

VIGTIGT: Du må ikke være gravid eller have kraftig menstruation, når vi laver undersøgelsen. Er du kendt med endometriose er det vigtigt du oplyser os om det.

HSU/GENNEMSKYLNING

HSU udføres for at vurdere, om der er passage igennem dine æggeledere. Undersøgelsen bruges også til at undersøge for forekomst af polypper, skillevægge, muskelknuder og sammenvoksninger i livmoderhulen, som kan være årsag til barnløshed.

FØR INDGREBET

Der kan forekomme menstruationslignende smerter under og efter undersøgelsen. Vi vil derfor anbefale, du tager følgende smertestillende medicin ca. 1 time før indgrebet: 2 stk tablet Panodil/Pinex 500 mg og 2 stk tablet Ipren 200 mg. Du kan tage din vanlige medicin, medmindre vi har aftalt andet. Du skal sætte 20 min. af til hele besøget, selve undersøgelsen tager 10 minutter.

ANKOMST TIL KLINIKKEN

Du bedes gå på toilettet når du ankommer til klinikken, da undersøgelsen er bedst at udføre med en tom blære.

UNDERSØGELSEN


Der indledes med en gynækologisk undersøgelse med ultralydsscanning og klamydiatest. Herefter føres et tyndt bøjeligt plastikkateter op gennem livmoderhalsen og placeres i livmoderhulen. Der sprøjtes væske igennem kateteret samtidig med,

at vi laver ultralydsscanning for at se, om der er passage af æggelederne. Til sidst laves ultralydsscanning af din livmoderhule.

MULIGE KOMPLIKATIONER

Der er altid en lille risiko for komplikationer, når man har haft et kateter oppe i livmoderen. Komplikationerne er heldigvis meget sjældne og oftest forbigående. Det er normalt at have menstruationslignende smerter og evt. lidt pletblødning efter undersøgelsen. Der er også en lille risiko for infektion efter indgrebet, dette kan behandles med antibiotika.

GODE RÅD



Du bør ikke have samleje, tage karbad eller gå i svømmehal/havet, så længe du bløder, og du bør bruge bind og ikke tamponer. Kontakt os på telefonnummer 36 46 71 40, hvis du i den første uge efter indgrebet har: Blødning kraftigere end en menstruation

Tegn på infektion: Ildelugtende udflåd, kraftige smerter, temperatur over 38,5 °C.

Hvis du oplever dette uden for Klinikken's åbningstid, skal du kontakte 1813.

HVEM KAN JEG RINGE TIL VED SPØRGSMÅL? Du er velkommen til at ringe til Kvindeklinden alle hverdage i telefontiden, på 36 46 71

